

SI EL PACIENTE ESTÁ ESTABLE, LA VÍA ORAL ES RAZONABLE

EL PACIENTE DEBE TENER CLARA LA IMPORTANCIA DE LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO Y SER CAPAZ DE HACERLO CORRECTAMENTE


VENTAJAS DE LA VÍA ORAL

- Reducción de complicaciones asociadas a catéter.
- Mayor confort e independencia del paciente (movilización precoz).
- Menos carga asistencial, menos costes y más altas hospitalarias.
- Reducción de recursos humanos y ambientales.
- Uso prudente de antibióticos (PROA).

¿CUÁNDO PLANTEAR LA VÍA ORAL?

- Estabilidad hemodinámica (TA, FC).
- Ausencia de fiebre > 24h.
- Mejoría en signos y síntomas de la infección.
- Mejoría analítica (leucocitosis, PCR, PCT)
- Tolerancia oral/enteral. Ausencia de:
 - > Disfagia grave.
 - > Vómitos o diarrea grave.
 - > Malabsorción.

VÍA ORAL IS THE NEW INTRAVENOSO



SECUENCIACIÓN

ANTIBIÓTICO	INTRAVENOSO (IV)	VÍA ORAL (VO)
LINEZOLID	600 mg/12h	600 mg/12h
TEDIZOLID	200 mg/24h	200 mg/24h
LEVOFLOXACINO	500 mg/24h	500 mg/24h
CIPROFLOXACINO	400 mg/12h	500 mg/12h
DELAFLORACINO	300 mg/12h	450 mg/12h
AMOXI-CLAV	1000/200 mg/8h	875/125 mg/8h
CEFTRIAXONA	2000 mg/24h	CEFDITORENO 400 mg/12h (NEUMONÍA)
		CEFIXIMA 200 mg/12h (ITU)
CLINDAMICINA	600 mg/8h	300 mg/8h
METRONIDAZOL	500 mg/8h	500 mg/8h
AZITROMICINA	500 mg/24h	500 mg/24h
COTRIMOXAZOL	800/160 mg/12h	800/160 mg/12h

DIAGNÓSTICO	Nº RCTS	Nº PACIENTES	VO VS IV
OSTEOMIELITIS	11	1.687	✓
BACTERIEMIA	12	1.055	✓
ENDOCARDITIS	4	536	✓
ITU	5	369	✓
INF INTRAABDOMINAL	7	1.763	✓
NEUMONÍA	12	2.158	✓

Valorar secuenciación a vía oral de forma temprana en antibióticos con elevada biodisponibilidad oral:

- Mismo efecto. =
- Menos costes. ↓
- Menos complicaciones. ↓